

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

El TC és per criteri mèdic, la millor prova per estudiar el seu problema de salut. Aquesta tècnica està destinada a observar les estructures anatòmiques de qualsevol part del cos, mitjançant l'ús de raig X. En ocasions és necessària l'administració de contrast iodat intravenós.

	Si	No
Li han realitzat estudis amb contrast?		
Va tenir alguna reacció al·lèrgica?		
Pateix alguna malaltia del cor, asma o insuficiència renal?		
En cas afirmatiu, indiqui quina:		
En cas de dones, possibilitat de embaràs?		

RISCOS I COMPLICACIONS DEL CONTRAST IODAT

L'estudi que li han sol·licitat és un procediment que utilitzant raigs X, pot produir un augment lleu del risc de patir càncer, aquest risc és molt baix en comparació amb la incidència normal de càncer de la nostra població.

En el seu estudi requereix l'administració de contrast iodat. Aquesta substància, s'injecta i permet visualitzar millor l'anatomia a explorar per obtenir una informació més extensa i detallada.

El contrast és un producte iodat de provada eficàcia i bona tolerància. Durant l'administració podrà notar sensacions desagradables però tolerables, principalment calor generalitzada (més cara i genitals), gust metàl·lic, formigueig en nas i coll, sensació d'orinar i, en menor freqüència, nàusees i vòmits.

Extravasació del contrast: La vena pot trencar-se durant la injecció i pot provocar una acumulació de contrast en teixit tou. No és perillós i generalment amb tractament mèdic, té solució en dos o tres dies.

Reaccions lleus com nàusees, vòmits, picor o taques a la pell (urticària), que es corregeixen fàcilment amb la medicació adequada. En **reaccions greus**, inflamació de parpelles i llavis que pot durar varies hores després de l'administració de medicació.

Excepcionalment, reaccions molt greus amb dificultat respiratòria (que poden necessitar intubació de la via aèria per assegurar la correcta respiració) alteracions circulatòries i/o altres símptomes (pèrdua de consciència, convulsions, etc). Aquest tipus de reaccions es donen només en 1 de cada 2.500 pacients i necessiten tractament mèdic. Excepcionalment, en 1 de cada 150.000 pacients, es produeix la mort.

Si es produeix alguna complicació, aquest servei disposa de personal i mitjans adequats per atendre'l en qualsevol moment.

Si després de llegir detingudament aquest consentiment, necessita qualsevol aclariment o més informació, no dubti en sol·licitar-lo al nostre personal sanitari.

Declaro que he comprès el contingut de la informació que he llegit, així com tots els riscos de l'exploració, que se'n puguin derivar, fins i tot aquells que, encara infreqüents, tenen consideració clínica molt greu. En qualsevol moment pot revocar aquest consentiment.

ESTÀ D'ACORD I DONA CONSENTIMENT PER ADMINISTRAR CONTRAST Si ☐ No ☐

PACIENT, FAMILIAR O REPRESENTANT: _____ **SIGNATURA:** _____

NOM I COGNOMS: _____ **DNI:** _____

METGE RESPONSABLE: _____ **SIGNATURA:** _____

NÚM. COLEGIAT: _____